



KALENDARZ SZCZEPIEŃ DOROSŁYCH MEDYCYNA PODRÓŻY

SZCZEPIONKA PRZECIW	WIEK (LATA)		
	19–49	50–65	>65
Grypie (IIV)	1 dawka co roku		
Błonicy, tężcowi, krztuścowi (Tdap)	1 dawka co 10 lat (osoba zaszczepiona w przeszłości w schemacie podstawowym) 3 dawki w schemacie 0, 1, 6 miesięcy (osoba wcześniej nieszczepiona)		
Odrze (MMR)	2 dawki w odstępie ≥ 4 tygodni (u osób, które nie chorowały na odrę i nie były szczepione)		
Covid-19	Liczba dawek zależna od historii szczepień i aktualnych zaleceń		
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu B	3 dawki (osoby wcześniej nieszczepione)		
Pneumokokom (PCV, PPSV)		1 dawka PCV-13 lub PCV-20	1 dawka PCV-13 + 1 dawka PPSV-23 lub 1 dawka PCV-20
Kleszczowemu zapaleniu mózgu	3 dawki + dawki przypominające co 3-5 lat (osoby, które nie chorowały i nie były szczepione)		
Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A	2 dawki (osoby, które nie chorowały i nie były szczepione)		
Meningokokom (MenB, MenACWY)	1 dawka		
Żółtej gorączce	1 dawka		
Durowi brzuszному	1 dawka (szczepionka inaktywowana) lub 3 dawki (szczepionka żywa)		
Cholerze	2 dawki (szczepionka inaktywowana) lub 1 dawka (szczepionka żywa)		
Japońskiemu zapaleniu mózgu	2 dawki		
Wściekliznie	2 lub 3 dawki		

□ szczepienia zalecane dla wszystkich nieuodpornionych osób w tym wieku

■ szczepienia zalecane podróżnym w zależności od celu podróży

IIV – szczepionka przeciw grypie, inaktywowana; **Tdap** – szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi; **MMR** – szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce; **PCV** – skoniugowana szczepionka przeciw pneumokokom; **PPSV** – polisacharydowa szczepionka przeciw pneumokokom; **MenACWY** – szczepionka przeciw meningokokom serogrupy A, C, W135, Y.

Szczepienia zalecane dla wszystkich nieuodpornionych dorosłych wymieniono w **kalendariuszu szczepień dorosłych**.

Źródło: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy.